

MEDIDAS PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DE MICROORGANISMOS

PRECAUCIONES EMPÍRICAS BASADAS EN SÍNDROMES CLÍNICOS

- Ciertos síndromes clínicos conllevan un riesgo que justifica el uso empírico de precauciones previo al diagnóstico microbiológico.
- Los pacientes con estos síndromes pueden presentar signos y síntomas atípicos, por lo que el grado de sospecha debe estar guiado por la prevalencia del síndrome en la comunidad.
- Tras la confirmación etiológica, adoptar precauciones según enfermedad/agente causal si procede, o mantener solo precauciones estándar.

RECUERDE: Las precauciones estándar se deben aplicar a todos los pacientes, independientemente de su diagnóstico. La adopción de precauciones basadas en el modo de transmisión no excluye el uso de precauciones estándar.



SÍNDROME CLÍNICO	PRECAUCIONES ADICIONALES
DIARREA	
• Diarrea aguda.	■ CONTACTO
MENINGITIS	
• Cuadro meníngeo.	■ GOTAS + ■ CONTACTO
EXANTEMA GENERALIZADO	
• Exantema petequial/equimótico + fiebre.	■ GOTAS
• Exantema petequial/equimótico + fiebre + viaje reciente a áreas de alto riesgo de transmisión de patógenos emergentes.	Consultar con Medicina Preventiva/Salud Pública
• Exantema maculopapular + fiebre + ≥ 1 de los siguientes síntomas: coriza, tos, conjuntivitis.	■ AIRE
• Exantema vesicular.	■ AIRE + ■ CONTACTO

SÍNDROME CLÍNICO	PRECAUCIONES ADICIONALES
INFECCIÓN RESPIRATORIA	
• Inicio súbito de síntomas generales y respiratorios en temporada de gripe.	■ GOTAS
• Tos (≥ 3 semanas) + fiebre +/- hemoptisis +/- pérdida de peso + Rx patológica.	■ AIRE + ■ CONTACTO
• Tos + fiebre + infiltrado pulmonar + viaje reciente a área de alto riesgo de transmisión de patógenos emergentes.	Consultar con Medicina Preventiva/Salud Pública
• Tos paroxística persistente.	■ GOTAS
• Bronquiolitis o croup en niños.	■ GOTAS + ■ CONTACTO



PRECAUCIONES ADICIONALES

