

VACUNACIÓN POR GRUPOS DE RIESGO EN ≥ 18 AÑOS

2024



Hepatitis B

Tétanos-difteria

Difteria-Tétanos- Pertussis

Haemophilus influenzae b

Neumococo conjugada

Meningococo B

Menigococo A, C, W, Y

Sarampión- Rubeola-Parotiditis

Varicela

Virus del Papiloma Humano

Herpes Zóster

Hepatitis A

Gripe

	Inmunodeprimidos (excluidos VIH)	VIH		Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónica. Diabetes	Enfermedad hepática crónica. Alcoholismo crónico	Insuficiencia renal crónica. Hemodiálisis	Asplenia, déficit complemento tratamiento con eculizumab	Embarazo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Hombres y mujeres en situación de prostitución	Mujeres con tratamiento lesión intraepitelial de alto riesgo de cervix	Contactos familiares y cuidadores de inmunodeprimidos	Profesionales sanitarios	Trasplantados progenitores hemotopoyéticos	Trasplante órgano sólido
		CD4<15% O <200µl	CD4≥15% O >200µl												
Hepatitis B	3-4 dosis	3-4 dosis			3-4 dosis	3-4 dosis			3 dosis	3 dosis			3 dosis	3-4 dosis	3-4 dosis
Tétanos-difteria	Vacunar o completar vacunación hasta 5 dosis														
Difteria-Tétanos- Pertussis								1 dosis					1 dosis ^(a)	4 dosis ^(b)	1 dosis ^(c)
Haemophilus influenzae b							1 dosis							4 dosis	
Neumococo conjugada	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis							4 dosis	1 dosis
Meningococo B							2 dosis							2 dosis	
Menigococo A, C, W, Y		2 dosis					2 dosis							2 dosis	
Sarampión- Rubeola-Parotiditis	X	X	Vacunar con dos dosis si susceptible ^(d)										X	X	
Varicela	X	X	Vacunar con dos dosis si susceptible ^(d)										X	X	
Virus del Papiloma Humano		3 dosis ^(e)							2 dosis ^(e)	2 dosis ^(e)	3 dosis			3 dosis	3 dosis
Herpes Zóster	2 dosis	2 dosis												2 dosis	2 dosis
Hepatitis A		3 dosis ^(f)	2 dosis		2 dosis				2 dosis	2 dosis			2 dosis ^(g)		
Gripe	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis				1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis

(a) Áreas pediátricas de riesgo.

(b) Se recomienda vacunación con DTPa de alta carga. En estos pacientes se acepta el uso de vacuna pediátrica hexavalente en todas las edades.

(c) Si no vacunado en los últimos 10 años.

(d) Si susceptible (no haber pasado la enfermedad o no vacunado con 2 dosis).

(e) Hasta los 26 años de edad.

(f) 3 dosis si CD4 < 350mm³.

(g) 2 dosis en trabajadores sanitarios que trabajan en entornos de riesgo o tienen factores de riesgo: mayores de 50 años susceptibles, hepatópatas crónicos o candidatos a trasplante hepático, inmunodeprimidos, personal de laboratorio en contacto con el VHA.

* Las recomendaciones de vacunación frente a COVID-19 se valorarán al final de la temporada 2023-2024.

X Vacuna contraindicada.



Administración en personas susceptibles o no vacunadas con anterioridad.



Comunidad de Madrid