

VACUNACIÓN POR GRUPOS DE RIESGO EN ≥ 18 AÑOS

2025



	Embarazo	Inmunodeprimidos (excluidos VIH)	VIH		Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónica. Diabetes	Enfermedad hepática crónica. Alcoholismo crónico	Insuficiencia renal crónica. Hemodiálisis	Asplenia, déficit complemento tratamiento con eculizumab o ravulizumab	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Hombres y mujeres en situación de prostitución	Mujeres con tratamiento lesión intraepitelial de alto riesgo de cervix	Contactos familiares y cuidadores de inmunodeprimidos	Profesionales sanitarios	Trasplantados progenitores hemotopoyéticos ⁽¹⁾	Trasplante órgano sólido
			CD4<15% O <200µl	CD4≥15% O >200µl											
Hepatitis B		3 dosis	3 dosis			3 dosis	3 dosis		3 dosis	3 dosis			3 dosis	3-4 dosis	3-4 dosis
Tétanos-difteria	Vacunar o completar vacunación hasta 5 dosis														
Difteria-Tétanos- Pertussis	1 dosis												1 dosis ^(a)	4 dosis ^(b)	1 dosis ^(c)
Haemophilus influenzae b							1 dosis							4 dosis	
Neumococo conjugada		1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis						4 dosis	1 dosis
Meningococo B							2 dosis							2 dosis	
Menigococo A, C, W, Y			2 dosis				2 dosis							2 dosis	
Sarampión-Rubeola-Parotiditis	X	X	X	Vacunar con dos dosis si susceptible ^(d)										X	X
Varicela	X	X	X	Vacunar con dos dosis si susceptible ^(d)										X	X
Virus del Papiloma Humano			3 dosis ^(e)						1-2 dosis ^(f)	1-2 dosis ^(f)	3 dosis			3 dosis ^(e)	3 dosis ^(e)
Herpes Zóster		2 dosis	2 dosis											2 dosis	2 dosis
Hepatitis A			3 dosis	2 dosis		2 dosis			2 dosis	2 dosis			2 dosis ^(g)		
Gripe	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis				1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis
COVID-19	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis				1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis

- (a) Áreas pediátricas de riesgo.
- (b) Se recomienda vacunación con DTPa de alta carga. En estos pacientes se acepta el uso de vacuna pediátrica hexavalente en todas las edades.
- (c) Si no vacunado en los últimos 10 años.
- (d) Si susceptible (no haber pasado la enfermedad o no vacunado con 2 dosis).
- (e) Hasta los 45 años de edad.
- (f) Pauta de 1 dosis hasta los 25 años y 2 dosis de 26-45 años.
- (g) 2 dosis en trabajadores sanitarios que trabajan en entornos de riesgo o tienen factores de riesgo.

(*) Vacunación en TPH: https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/docs/tabla_16_y_17.pdf

X Vacuna contraindicada. Administración en personas susceptibles o no vacunadas con anterioridad.



Comunidad de Madrid