

PROTÉGEZ VOTRE BÉBÉ

de la **bronchiolite** et d'autres
infections respiratoires

Campagne d'immunisation
contre le virus respiratoire
syncytial (VRS)



Dirección General de Salud Pública
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD



Campagne d'immunisation contre le virus respiratoire syncytial (VRS)

À partir du 1er Octobre de l'année en cours, la Communauté de Madrid lance la campagne d'immunisation des nouveau-nés et des nourrissons contre le VRS, le principal virus responsable de la bronchiolite.

Où aura-t-elle lieu ?

Pour les bébés nés entre le 1er octobre de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante et résidents de la Communauté de Madrid, dans les **maternités** avant la sortie de l'hôpital.

À partir du 1er Octobre, pour les bébés nés entre le 1er avril et le 30 septembre de l'année en cours, dans **neufs hôpitaux publics de la Communauté de Madrid** via l'application de prise de rendez-vous Autocita.

Qu'est-ce que le virus respiratoire syncytial (VRS) ?

Il s'agit d'un virus saisonnier, dont la circulation annuelle a lieu principalement **entre octobre et mars**.

Il provoque **des infections respiratoires, en particulier chez les enfants de moins de 2 ans**. C'est le principal responsable de bronchiolite (infection respiratoire qui touche les plus petites voies respiratoires et peut provoquer des mucosités nasales, une difficulté respiratoire et des sifflements). Cette pathologie est à l'origine d'un grand nombre de consultations de soins primaires et d'urgences.

Elle peut entraîner des **problèmes** plus graves pour les nourrissons prématurés ou les enfants qui ont des maladies pulmonaires ou cardiologiques chroniques ou d'un déficit du système immunitaire.

Comment prévenir l'infection du VRS ?

À travers d'une immunisation au nirsevimab (Beyfortus®). Ce médicament permet d'injecter des anticorps contre le VRS afin de bloquer le virus.

Il est administré en une seule injection qui protège pendant 5 mois minimum, couvrant la période où l'infection est plus fréquente (d'octobre à mars). La dose dépend du poids de l'enfant.

Y a-t-il des effets secondaires ?

Ce médicament a démontré un très bon profil de sécurité. Les effets secondaires les plus fréquents sont : une éruption cutanée, qui peut survenir jusqu'à 2 semaines après l'administration, de la fièvre et une douleur au point d'injection.

Pour plus d'informations sur les dates de la campagne, l'âge des bébés et les lieux d'administration:

<https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/virus-respiratorio-sincitial-vrs>

Tout problème de santé survenant après l'administration de ce médicament peut être consulté avec votre pédiatre.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également signaler les effets indésirables liés à ce médicament directement à <https://www.notificaram.es/>