

VACUNACIÓN POR GRUPOS DE RIESGO EN ≥ 18 AÑOS

2026



Hepatitis B

Tétanos-difteria

Difteria-Tétanos- Pertussis

Haemophilus influenzae b

Neumococo conjugada

Meningococo B

Meningococo A, C, W, Y

Sarampión-Rubeola-Parotiditis

Varicela

Virus del Papiloma Humano

Herpes Zóster

Hepatitis A

Gripe

Virus respiratorio sincital

COVID-19

Embarazo	Inmunodeprimidos (excluidos VIH)	VIH		Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónica. Diabetes	Enfermedad hepática crónica. Alcoholismo crónico	Insuficiencia renal crónica. Hemodiálisis	Asplenia, déficit complemento, tratamiento con inhibidores del complemento	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Hombres y mujeres en situación de prostitución	Mujeres con tratamiento lesión intraepitelial de alto riesgo de cervix	Contactos familiares y cuidadores de inmunodeprimidos	Profesionales sanitarios	Trasplante progenitores hemotopoyéticos ^(*)	Trasplante órgano sólido
		CD4<15% O <200µl	CD4≥15% O >200µl											
	3 dosis	3 dosis			3 dosis	3 dosis		3 dosis	3 dosis			3 dosis	3-4 dosis	3-4 dosis
	Vacunar o completar vacunación hasta 5 dosis													
1 dosis												1 dosis ^(a)	4 dosis ^(b)	1 dosis ^(c)
							1 dosis						4 dosis	
	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis				4 dosis		1 dosis	
							2 dosis				2 dosis			
			2 dosis				2 dosis						2 dosis	
X	X	X	Vacunar con dos dosis si susceptible ^(d)										X	X
X	X	X	Vacunar con dos dosis si susceptible ^(d)										X	X
		3 dosis ^(e)						1-2 dosis ^(f)	1-2 dosis ^(f)	3 dosis			3 dosis ^(e)	3 dosis ^(e)
	2 dosis ^(g)	2 dosis								2 dosis		2 dosis		
		3 dosis	2 dosis			2 dosis		2 dosis	2 dosis			2 dosis ^(h)		
1 dosis	1 dosis	1 dosis		1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis				1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis
		1 dosis ⁽ⁱ⁾ (vacuna)											1 dosis ⁽ⁱ⁾ (vacuna)	1 dosis ⁽ⁱ⁾ (vacuna)
1 dosis ^(j)	1 dosis ^(j)	1 dosis ^(j)		1 dosis ^(j)	1 dosis ^(j)	1 dosis ^(j)	1 dosis ^(j)				1 dosis ^(j)	1 dosis ^(j)	1 dosis ^(j)	1 dosis ^(j)

- (a) Áreas pediátricas de riesgo.

(b) Se recomienda vacunación con DTPa de alta carga. En estos pacientes se acepta el uso de vacuna pediátrica hexavalente en todas las edades.

(c) Si no vacunado en los últimos 10 años.

(d) Si susceptible (no haber pasado la enfermedad o no vacunado con 2 dosis).

(e) Hasta los 45 años de edad.

(f) Pauta de 1 dosis hasta los 25 años y 2 dosis de 26-45 años.

(g) Solo en determinadas condiciones o tratamientos inmunosupresores (ver apartado 13).
- (h) En trabajadores sanitarios que trabajan en entornos de riesgo o tienen factores de riesgo.

(i) Personas a partir de 18 años de edad con las condiciones de muy alto riesgo definidas en el apartado 2.

(j) Las recomendaciones de vacunación se definirán previamente al inicio de cada temporada.

(*) Vacunación en TPH: https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/docs/tabla_16_y_17.pdf

X Vacuna contraindicada. Con rayas Administración en personas susceptibles o no vacunadas con anterioridad.