



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

frente a la **gripe**

Campaña de vacunación infantil para la protección frente a la gripe

La Comunidad de Madrid recomienda la vacunación frente a la gripe a los niños entre 6 meses y los 7 años.

¿A quién se administra?

A menores **entre 6 meses y 7 años de edad** residentes en la Comunidad de Madrid.

La vacunación infantil frente a la gripe se realiza en los **Centros de Salud y Consultorios Locales del Servicio Madrileño de Salud**, así como en los **Centros Municipales de Salud del Ayuntamiento de Madrid, Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid** y en los distintos **centros sanitarios** autorizados para la vacunación en la región.

¿Cómo afecta la gripe en la edad infantil?

- La gripe es una enfermedad que se presenta, principalmente, en otoño-invierno. El virus de la gripe cambia con mucha facilidad, siendo diferente cada temporada.
- La frecuencia de la gripe en niños es muy elevada, entre tres y cuatro veces más alta que en adultos.
- Los niños liberan mayor cantidad de virus y durante un período de tiempo más prolongado que los adultos, por lo que son transmisores de la enfermedad.
- La gripe es causa de hospitalizaciones, visitas médicas y consumo de antibióticos en la población infantil sana. Las complicaciones que pueden aparecer son, sobre todo, respiratorias, como obstrucción bronquial y neumonía y, por otro lado, otitis media aguda.

¿Cómo podemos evitar la infección por gripe?

- La forma de prevenir la gripe es la vacunación, que debe realizarse cada temporada.
- La vacunación infantil también protege de forma indirecta al resto de la población, como a las personas mayores de 60 años, quienes tienen más riesgo de sufrir complicaciones y mayor índice de mortalidad por gripe.
- Hay disponibles **dos tipos de vacunas** con indicación infantil:
 - Vacunas inactivadas de administración intramuscular o subcutánea profunda
 - Vacuna de virus atenuados de administración intranasal.
- Ambos tipos de vacuna son eficaces y seguras en población infantil.
- Los bebés entre 6 y 23 meses reciben la **vacuna inactivada intramuscular**.
- **La vacuna intranasal** se administra a los menores de 2 a 7 años de edad, ambos incluidos no inmunodeprimidos ni asma*.
- Se recomienda una dosis única de vacuna; los niños con condiciones de riesgo recibirán dos dosis separadas al menos cuatro semanas entre sí.

¿Tiene efectos secundarios?

Los propios de cualquier vacuna o medicamento de inmunización. Los efectos secundarios más frecuentes de la vacuna inyectada son irritabilidad y pérdida de apetito. Los efectos secundarios más frecuentes de la vacuna intranasal son malestar, congestión nasal, febrícula, cefalea y mialgia.

Cualquier alteración de salud que aparezca después de la administración de la vacuna puede consultarla con su pediatra.

Además, si lo desea, puede notificar directamente los acontecimientos adversos que considere relacionados con este medicamento en <https://www.notificaram.es>