

احمي طفلك

من التهاب القصبيات والتهابات
الجهاز التنفسي الأخرى.

حملة التحصين في مواجهة فيروس
المخلوي التنفسي.



Comunidad
de Madrid



Comunidad
de Madrid

Dirección General de Salud Pública
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD

كيف يمكننا تجنب الإصابة بعدوى الفيروس الخلوي التنفسي (VRS)؟

من خلال التحصين بعقار نيرسيفيماب (بيفورتوس) باستخدام هذا nirsevimab (Beyfortus®) الدواء يتم حقن الأجسام المضادة ضد الفيروس الخلوي التنفسي (VRS) لعرقلة نشاطه .

يتم إعطاؤه عن طريق حقنة واحدة تحمي ، على الأقل لمدة ٥ أشهر ، و تغطي الفترة التي تكون فيها العدوى أكثر شيوعا (ما بين أكتوبر و مارس) . تعتمد الجرعة على وزن الطفل.

هل له آثار جانبية ؟

هذا الدواء له ملف أمان جيد للغاية
الآثار الجانبية الأكثر شيوعا هي الطفح الجلدي
قد يحدث ما يصل إلى ٢ أسابيع بعد تناوله ، والحمى والألم في موقع الحقن .

للمزيد من المعلومات :

<https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/virus-respiratorio-sincitial-vrs>

يمكن مناقشة أي مشاكل صحية تظهر بعد إعطاء هذا الدواء مع طبيب الأطفال .

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك الإبلاغ مباشرة عن الأحداث السلبية المتعلقة بهذا الدواء على

www.notificaram.es

حملة التحصين في مواجهة فيروس المخلوي التنفسي

أطلق مجتمع مدريد في ١ أكتوبر الحملة الثانية لتحصين الأطفال حديثي الولادة والرضع ضد فيروس الجهاز التنفسي المخلوي المسبب الرئيسي للتهاب القصيبات (VRS).

أين سيتم إعطاؤها ؟

تعطى في مراكز الولادة ، قبل الخروج منها ، للرضع المولودين ما بين ١ أكتوبر من هذه السنة و ٣١ مارس من السنة المقبلة ، المقيمين في مقاطعة مدريد .

إبتداءً من ١ أكتوبر ، سيتم توفيرها بعد حجز الموعد ذاتيا ، للأطفال المولودين ما بين ١ أبريل و ٣٠ سبتمبر من هذا العام في المستشفيات العمومية المعتمدة بمقاطعة مدريد .

ما هو فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (VRS)؟

إنه فيروس موسمي ينتشر ، بشكل مبدئي ، ما بين أكتوبر و مارس .

يسبب التهابات بالجهاز التنفسي ، خصوصا لدى الأطفال دون السن الثانية و يعتبر السبب الرئيسي في التهاب القنوة الهوائية الصغيرة (البرونكيوليتيس) وهو عدوى الجهاز التنفسي الذي يؤثر على أصغر المسالك الهوائية ويمكن أن يسبب مخاط بالأنف ، صعوبة في التنفس و صفير وشرخ في الصوت عند التنفس . عدوى الفيروس المخلوي هو موضوع عدد كبير من الاستشارات الطبية في مراكز الرعاية الأولية و المستعجلات .

يكون الأطفال المبتسرون والرضع أكثر عرضة لخطر حدوث مضاعفات الأطفال الذين يعانون من أمراض الرئة أو أمراض القلب المزمنة أو بعض أنواع نقص الجهاز المناعي .